



“APLICACIÓN URBANA INTERIOR Y EXTERIOR”



6 SC alfacipermetrina

Suspensión Concentrada
Insecticida Piretroide

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Alfacipermetrina: mezcla racémica de (R)- α -ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)- α -ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 60 g de i.a./L a 20°C)

5.45

INGREDIENTES INERTES:

Diluyente, antiespumante, cosolventes, dispersantes, espesantes y preservativo.

94.55

TOTAL: 100.00

No. de registro: RSCO URB INAC-0182-X0008-064-5.45



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala

“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

“INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

ECOMASTER ALF es un insecticida-acaricida piretroide que actúa por contacto e ingestión indicado para el control de insectos voladores rastreros, formulado como suspensión concentrada para ser aplicado en superficies y en el suelo mediante pulverización de gota, uso interior exterior. Su aplicación debe ser efectuada por profesionales en el control de plagas urbanas.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	MODO DE APLICACIÓN	DOSIS
Mosquitos	<i>Culex spp, Aedes spp, Anopheles spp</i>	Aplique sobre la superficie donde los insectos se posan.	
Moscas	<i>Musca domestica, Fannia spp, Drosophila spp</i>		
Cucarachas: Germanica De banda café Café Oriental Americana	<i>Blatella germánica, Supella supellectilium, Periplaneta fuliginosa, Blatta orientalis, Periplaneta americana</i>	Aplique en grietas, hendiduras, alrededor de conductos de servicios, detrás y debajo de electrodomésticos y mobiliario. Aplique en bandas de 10 cm de ancho el exterior de puertas y ventanas para evitar el ingreso de los insectos.	En infestaciones ligeras y aplicación de mantenimiento: 5 mL de ECOMASTER ALF 1 L de agua, para cubrir una superficie de 20 m ² . (25 mL / 5L para cubrir 100 m ²)
Arañas	<i>Latrodectus mactans, Loxosceles spp</i>		
Alacranes	<i>Centruroides spp</i>		
Grillo	<i>Acheta domesticus</i>		
Hormigas: Cosechadora De fuego Argentina Faraona De cabeza grande Del pavimento Pequeña hormiga del fuego Doméstica Carpintera	<i>Pogonomyrmex sp, Solenopsis sp, Iridomyrmex humilis, Monomorium pharaonis, Pheidole megacephala, Tetramorium sp, Wasmannia auropunctata, Tapinoma spp, Camponotus spp</i>	Aplique alrededor de los nidos y a lo largo de sus vías de paso. Aplique en bandas como barrera a los lugares de entrada	Para infestaciones fuertes ó en superficies sucias o porosas: 10 mL de ECOMASTER ALF en 1 L de agua, para cubrir una superficie de 20 m ² .
Chinches	<i>Triatoma spp, Rhodnius prolixus, Cimex spp</i>	Aplique sobre el armazón de la cama y alrededor de la cama en muros, suelos y mobiliario. Aplique principalmente en las grietas y hendiduras.	
Chinche de la cama	<i>Triatoma spp, Rhodnius prolixus, Cimex spp</i>		
Escarabajo de las alfombras	<i>Anthrenus scrophulariae, Attagenus unicolor, Anthrenus verbasci, Anthrenus pimpinellae</i>	Aplique en grietas y hendiduras donde estas plagas habitan comúnmente.	20 mL de ECOMASTER ALF diluido en 5 L de agua para cubrir una superficie de 20 m ² .

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicarse a un intervalo de 3 a 4 semanas entre aplicaciones o antes dependiendo del tipo de superficie ó infestación.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: 12 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: **ECOMASTER ALPHA** debe ser aplicado en dilución con agua. Utilice su equipo protección personal indicado en la sección de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Abra el envase quitando el sello cuidadosamente para evitar salpicaduras de producto.

Preparación de la solución de aplicación: Vacíe agua en el tanque de aplicación hasta ¾ partes de la cantidad requerida, mida con una probeta la dosis recomendada para la plaga a controlar de **ECOMASTER ALPHA** y añádala al tanque de aplicación, agite mientras agrega el resto de agua, cierre el tanque y agite enérgicamente. Aplique el producto. Vuelva a agitar el tanque antes de volver a usarlo si se interrumpe momentáneamente el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES: No aplique **ECOMASTER ALPHA** durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes. No realice las aspersiones si hay población que pueda entrar contacto directo con el producto, de suceder lo anterior, aplicar las medidas de emergencia enunciadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: **ECOMASTER ALPHA** debe aplicarse solo, no se recomienda su uso en mezcla con otros plaguicidas.



PRECAUCIÓN

