



| | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------|
| Fecha de elaboración: | 26.09.2023 | Fecha de actualización: | 26.09.2023 |
| Identificación de la empresa importadora: | ECONTROL SERVICIOS Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V. | | |
| Identificación de la empresa distribuidora: | GREEN ARQ S.A. DE C.V. AV. Nance No. 1528, Jardines de la victoria C.P. 44900, Guadalajara, Jal. TEL: 33 2106 6559 | | |
|  | | | |
| “COMPOSICIÓN PORCENTUAL” | | % en peso | |
| Ingrediente activo: | | 2.15 | |
| Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolinin-2-ilidenamina (Equivalente a 21.5g de i.a./Kg) | | <u>97.85</u> | |
| Ingredientes inertes: | | | |
| Amargante, Atrayentes, Gelificante y Disolvente | | | |
| TOTAL | | 100.00 | |
| RSCO-INAC-0199-X0591-092-2.15 | | | |
| Titular del registro: ECONTROL SERVICIOS Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V. Distribuidor: GREEN ARQ S.A. DE C.V. | | | |
| Peligros: | Categoría toxicología: 5 | | |
| | Palabra señal: Precaución | | |
| | Puede ser nocivo en caso de ingestión | | |
| | Puede ser nocivo por el contacto con la piel | | |
| | Puede ser nocivo si se inhala | | |
| |   | | |
| |  | | |
|     | | | |

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de sobreexposición: retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa, manténgala bien abrigada y en reposo.

En caso de ingestión: Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. No provoque el vómito a menos que así lo indique el personal médico. Obtenga atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada. Lave con abundante agua y jabón sin frotar. Obtenga atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante 15 minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presentes y si es fácil de hacer. Continuar enjuagando con agua. Obtenga atención médica inmediatamente.

En caso de inhalación, lleve a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona está inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no introduzca nada en la boca, consulte al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Grupo químico del producto: Neonicotinoides

Tratamiento específico: Proporcionar medidas generales de apoyo y tratar sintomáticamente. Mantenga a la persona intoxicada bajo observación. Signos y síntomas de intoxicación: Ingestión, puede causar irritación leve en boca y garganta; Contacto con la piel, puede causar irritación leve. Inhalación, es poco probable, si sucede, puede causar irritación de la nariz.

INSTRUCCIONES DE USO

ECOGEL es un gel insecticida de aplicación en interiores listo para el uso, con una alta apetencia y eficacia tanto para las ninfas como los adultos. Su formulación permite una aplicación localizada, ideal para áreas “sensibles”. Antes de la aplicación se aconseja proceder a una amplia inspección con monitoreo. Utilizar como insecticida en el control de cucarachas en: Todo tipo de edificios públicos, comerciales, de viviendas, industriales, teatros, prisiones, almacenes, aviones, trenes, vehículos. Todo tipo de instalaciones hoteleras, de alimentación, hoteles, bares, restaurantes, cocinas, tiendas, supermercados.

Aplicar gotas de **ECOGEL**, cerca de los sitios donde habitan las cucarachas, lugares de paso, lugares cálidos y húmedos, insistiendo detrás de los frigoríficos y otros aparatos de motor. En lugares de difícil acceso, como grietas, ranuras, rendijas, detrás de los muebles, donde las gotas no se vean y queden al resguardo de niños y animales, o aplicar mediante trampas en lugares potencialmente expuestos. Aplicar especialmente en rincones oscuros y húmedos, o con altas temperaturas y aquellos con restos de comida o materia orgánica.

Aplicación puntual de **ECOGEL** mediante pistola aplicadora de forma localizada, por medio de pequeñas gotas de 0,04 gramos. En casos de infestaciones severas, se recomienda doblar la dosis e inspeccionar al cabo de un mes, habitualmente una aplicación puede ser efectiva durante más de tres meses.

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS

No requiere tiempo de reentrada

CONTRAINDICACIONES

No mezclar con otros productos químicos o en áreas recientemente tratadas con otro insecticida.

No lo aplique sobre madera o superficies porosas.

Evite el contacto con las superficies tratadas.

No exponga las gotas de cebo a la luz directa del sol o a fuentes de calor.

| PLAGA: CUCARACHAS | | RECOMENDACIONES |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| Nombre común | Nombre científico | |
| Cucaracha alemana | <i>Blatella germanica</i> | En aplicaciones con cartucho, aplicar de 1 a 6 gotas dependiendo de la especie. En aplicaciones con jeringuilla de 15 a 30 gotas cada 10m ² . Se recomienda efectuar una aplicación cada 4 semanas y volver a aplicar una vez más si la infestación persiste. 3 meses después de que la infestación termine, puede volverse a aplicar el tratamiento |
| Cucaracha oriental o cucarachón | <i>Blatta orientalis</i> | |
| Cucaracha americana o de alcantarilla | <i>Periplaneta americana</i> | |
| Cucaracha australiana | <i>Periplaneta australasiae</i> | |