



“APLICACIÓN URBANA INTERIOR Y EXTERIOR”



25 C.E. fipronil

Suspensión Concentrada
Insecticida Fenilpirazol

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: Fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α,α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo (Equivalente a 26.12 g de i.a./L a 20°C)	2.87
INGREDIENTES INERTES: Solventes y emulsificantes	97.13
TOTAL:	100.00

No. de registro: RSCO-URB-INAC-0101A-X0027-009-2.87



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala

“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”



"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

ECOMASTER FIP 25 CE, es un insecticida de efecto residual indicado para aplicarse sobre grietas, hendiduras donde las plagas habitan comúnmente, también puede aplicarse debajo de muebles, detrás de fregaderos, armarios, plomería, gabinetes u otras áreas donde puedan esconderse las plagas, uso interior y exterior. Utilice **ECOMASTER FIP 25 CE**, controla las siguientes plagas:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS
Termitas:		
Subterráneas	<i>Reticulitermes spp</i> , <i>Zootermopsis spp</i> <i>Heteroterms spp</i> , <i>Coptotermes spp</i>	2 L en 100 L para infestaciones normales
De la madera seca	<i>Marginitermes hubbardi</i> <i>Cryptotermes spp</i> <i>Kaloterms sp</i>	4 L en 100 L para infestaciones severas
De nidos acartonados	<i>Nasutitermes spp</i>	
Cucarachas:		
Germanica De bandas cafés Café Oriental Americana	<i>Blattella germanica</i> <i>Supella supellecillum</i> <i>Periplaneta fuliginosa</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i>	60 mL en 10 L de agua
Hormigas:		
Cosechadora De fuego Argentina Faraona De cabeza grande Del pavimento Pequeña hormiga del fuego Doméstica Carpintera	<i>Pogonomyrmex sp</i> <i>Solenopsis sp</i> <i>Iridomyrmex humilis</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Pheidole megacephala</i> <i>Tetramorium sp</i> <i>Wasmannia auropunctata</i> <i>Tapinoma spp</i> <i>Camponotus spp</i>	60 mL en 10 L de agua
Otras plagas:		
Moscas	<i>Musca domestica</i> <i>Fannia spp</i> <i>Drosophila spp</i>	
Mosquitos	<i>Culex spp</i> , <i>Aedes spp</i> , <i>Anopheles spp</i>	
Avispas o véspidos	<i>Vespula spp</i> , <i>Vespa spp</i>	
Pulgas	<i>Xenopsylla spp</i> <i>Ctenocephalides spp</i>	
Chinches	<i>Triatoma spp</i> <i>Rhodnius prolixus</i>	
Chinche de la cama	<i>Cimex spp</i>	10 mL/L de agua para infestaciones normales
Pescadito de plata	<i>Lepisma spp</i>	
Grillo	<i>Acheta domesticus</i>	20 mL/L de agua para infestaciones severas.
Cochinillas	<i>Isopoda</i>	
Tijerilla	<i>Forficula auricularia</i>	
Alacranes	<i>Centruroides spp</i>	
Arañas	<i>Latrodectus mactans</i> , <i>Loxosceles spp</i>	
Ciempíes	<i>Quilopodos y diplopodos</i>	
Gorgojos	<i>Tribolium castaneum</i> <i>Sitophilus oryzae</i> , <i>Trogoderma granarium</i> <i>Tenebroides spp</i>	
Garrapatas	<i>Ixodidae</i>	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Aplicarse a un intervalo de 3 a 4 semanas entre aplicaciones.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: 2 horas o inmediatamente después de que el tratamiento haya secado.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, abra el envase, desensosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicarse, el producto debe ser diluido en agua limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **ECOMASTER FIP 25 CE**, medida con ayuda de una probeta y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No aplique **ECOMASTER FIP 25 CE**, durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes. Las aplicaciones deben realizarse únicamente en exteriores de las instalaciones.

INCOMPATIBILIDAD: **ECOMASTER FIP 25 CE**, debe aplicarse solo, no se recomienda su uso en mezcla con otros plaguicidas.



PRECAUCIÓN

