

“NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



## piretrinas I y II

**Polvo Seco**

**Insecticida-Acaricida**

“USO DOMÉSTICO”

### **COMPOSICIÓN PORCENTUAL**

### **% EN PESO**

#### **INGREDIENTE ACTIVO:**

Piretrinas (I y II): Piretrinas

2 g de i.a./kg

#### **INGREDIENTES INERTES:**

Ajustador de pH y Vehículo

No. de Registro: RSCO-DOM-INAC-0185-X0028-454-0.2

Puede ser nocivo en caso de ingestión

Puede ser nocivo por el contacto con la piel

Puede ser nocivo si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”

**PRECAUCIÓN**

**"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"**  
**"INSTRUCCIONES DE USO",**  
**"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"**

**PIREMASTER**, es un insecticida listo para usar, no tiene olor, uso doméstico que ayuda a combatir las siguientes plagas:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	OBSERVACIONES
Cucaracha alemana Cucaracha americana Cucaracha Oriental	<i>Blatella germánica</i> <i>Periplaneta americana</i> <i>Blatta orientalis</i>	Aplique este producto en áreas donde las cucarachas se esconden o viven (debajo y atrás de aparatos electrodomésticos; en vacíos de plomería accesibles por medio de agujeros, alrededor de plomería y drenajes; en espacios vacíos debajo de gabinetes de cocina y baño. Muchos gabinetes tienen un espacio arriba de fácil acceso. Si no hay fácil acceso, taladre un agujero pequeño arriba del gabinete; en hendiduras alrededor de ventanas, puertas y gabinetes: debajo y atrás de calentadores de agua, lavadoras y secadoras. Asegúrese de aplicar en los vacíos de la plomería: en desvanes, alrededor del perímetro de tubería de respiraderos, arriba de cocinas y baños, alrededor de perímetros de cielos rasos, en los huecos de los ascensores, conductos de basura; debajo y atrás de cajas en las bodegas.
Hormiga argentina Hormiga carpintera Hormiga de fuego Hormiga faraón Hormiga doméstica apestosa Hormiga del pavimento Hormiga grande amarilla Hormiga cortadora de hojas	<i>Iridomyrmex humilis</i> <i>Camponotus spp.</i> <i>Sotenopsis spp.</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Tapinoma sessile</i> <i>Teramorium caespitum</i> <i>Acanthomyops interjectus</i> <i>Atta spp.</i>	Indique el punto de infestación. Usando un espolvoreador, inyecte el polvo de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades.

Pescadito de plata	<i>Leosima sacchahna</i>	Aplique en cantidades pequeñas directamente a las hendiduras y aberturas usando un espolvoreador u otro instrumento adecuado para aplicar el insecticida directamente. Los pescaditos se encuentran en áreas asociadas con el calor, como en los espacios donde hay calentadores o humedad, como cerca de los tubos de agua.
Termita de madera seca  Termita subterránea	<i>criptotermes brevis</i> <i>Incisitermes marginipennis</i>  <i>Captotermes crassus</i> <i>Heterotermes aureus</i> <i>Convexinotatus</i> <i>Reticulitermes flavipes</i> <i>Reticulitermes hesperus</i>	En infestaciones localizadas, aplique a puntos directos. Trate de localizar los túneles. Taladre la madera infestada con hoyos de 1/4 de pulgada de diámetro en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades usando fuelles o espolvoreadores. En paredes de bloques con espacio, taladre hoyos de 1/4 de pulgada en la pared en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en las cavidades usando muelles o espolvoreadores.
Alacránes	<i>Centuroides spp</i>	En áreas de interiores como rendijas en piezas de madera, closets, alrededor de la plomería, en las vías de acceso, puertas o ventanas y en otras áreas donde los alacranes pudieran esconderse, deberán tratarse con cuidado.
Arañas	<i>Latrodectus spp.</i> <i>Loxosceles spp.</i>	Muchas arañas se encuentran asociadas con la humedad y por lo tanto, se encuentran en sótanos, en espacios donde se pueden arrastrar los insectos y en otras partes húmedas de las construcciones. Otras viven en los lugares secos, cálidos, por lo que se encuentran en las ventilas del aire de los subpisos, en esquinas superiores de las habitaciones o en los áticos. Casi todas las especies se esconden en las hendiduras, en áreas oscuras o en otros lugares donde puedan construir la seda.

Anóbidos	<i>Calymmaderus oblongus</i> <i>Ernobius punctulatus</i>	
Brostriquidos	<i>Xylobiops basilaris</i>	En infestaciones localizadas, aplique a punto directos. Trate de localizar los túneles. Taladre madera infestada con hoyos de 1/4 de pulgada de diámetro en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades usando fuelles o espolvoreadores.
Escarabajos de la madera	<i>Lyctus planicollis</i>	
<p><b>Tiempo de reentradas a las zonas tratadas:</b> Esperar por lo menos una hora después de la aplicación. Se recomienda ventilar el lugar por 30 minutos y después ingresar.</p> <p><b>Frecuencia de aplicación:</b> La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de la plaga, por lo que deberán de realizar inspecciones quincenales.</p> <p><b>Intervalo entre aplicaciones:</b> Estará determinado por la infestación del lugar tratado.</p>		

#### Aplicación en residencias:

El producto solo se debe de aplicar en áreas inaccesibles para las personas y animales domésticos. No usar en áreas comestibles. Cualquier polvo visible después de la aplicación debe ser removido hacia las áreas de aplicación como hendiduras o grietas.

Dosis: 454 g por m<sup>2</sup> de espacio.

#### Aplicación en establecimientos donde se manejan alimentos

Las aplicaciones de este producto en las áreas de establecimiento donde se manejan alimentos no son permitidas, excepto en grietas, hendiduras y aberturas. Se debe tener cuidado para evitar que el producto sea esparcido por el aire. Evite la contaminación de alimentos y superficies donde se procesan éstos.

Dosis: 454 g por m<sup>2</sup> de espacio.

**Aplicación alcantarilla**

Utilizar fuentes portátiles o un tanque a base de presión de aire.

Dosis: 3.632 kg por cada m<sup>2</sup>

**Previo a la aplicación del producto, se recomienda las siguientes acciones:**

- Realizar una inspección para identificar los lugares, la presencia e intensidad de la infestación de las plagas.
- Sacar cualquier animal doméstico del área a tratar.
- Guardar y cubrir con bolsas cualquier alimento de consumo directo.

**Durante la aplicación:**

- Utilizar equipo de protección personal.
- Nunca aplicar en presencia de personas que carecen del equipo de protección personal o mascotas.
- Dirigir la aplicación en grietas, interior de las coladeras, fregaderos y hendiduras.
- Realizar una aplicación de tipo perimetral, formando una banda de protección.
- No contaminar depósitos de agua en interiores y exteriores.

**Contraindicaciones:**

- No asperjar el producto en áreas sucias o cubiertas por polvos y/o grasas, ya que pueden afectar la efectividad del producto.
- No aplicar en áreas húmedas.
- **PIREMASTER**, no debe de ser aplicado en mezcla con ningún otro producto.