

Formulado y distribuido por:
Allister de México S.A. de C.V.
Av. Circunvalación Sur No. 5
Col. Las Fuentes, C.P. 45070
Zapopan, Jalisco, México
Conmutador: (33) 31 33 00 13
(33) 31 33 98 16
e-mail: allister@allister.com.mx



Centro de Información Toxicológica
(ATOX):
01 800 000 28 69

Clasificación



UN: 2588 Plaguicida sólido, toxico, N.E.P.
(Abamectina, 0.05%)

Información general

Nombre Comercial:	SANGHA GEL ®
Descripción:	Insecticida de uso doméstico a base de Abamectina.
Ingrediente activo:	Abamectina.
Familia química:	Avermectinas (lactona macrocíclica).
Nombre químico:	<i>Abamectina es una mezcla de dos tipos de avermectinas B1a no menos del 80% y no menos del 20% de Avermectina B1b.</i>
Tipo de formulación:	Gel.

Ingrediente activo	% en peso
Abamectina	0.05
Diluyentes y Dispersantes	99.95
Total	100

Este producto se utiliza en aplicaciones únicas o bien como parte de un programa de control integral. El programa debe incluir medidas sanitarias, entre ellas la protección de las reservas alimenticias, eliminación adecuada de la basura y la reparación de daños estructurales como grietas y hendiduras para evitar que las plagas encuentren sitios de refugio.

Antes de iniciar con el tratamiento de **Sangha[®] Gel**, se recomienda realizar una buena inspección previa al tratamiento para evaluar el grado de infección, si después de aplicar y realizar una evaluación el gel ha sido consumido en su totalidad, pero las cucarachas están todavía presentes habrá que reemplazar los cebos y si el gel está presente sin haber sido consumido la infestación está eliminada o bien es necesario elegir nuevos sitios de cebado.

Sangha[®] Gel es fácil de manejar. No requiere de preparación previa ni uso de aspersores. Para la aplicación es necesario retirar el tapón que cubre la boquilla de la jeringa, presione ligeramente el embolo depositando pequeñas porciones o tiras en los lugares de refugio y fuentes de alimentación de estas.

No es necesario esperar para entrar a los lugares tratados ya que la aplicación de **Sangha[®] Gel** se realiza en forma selectiva, sin preparación previa ni uso de aspersores evitando el desprendimiento de olores y vapores.

PLAGA	DOSIS	LUGARES DE APLICACIÓN
<p>Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Cucaracha germánica (<i>Blatella germanica</i>)</p>	<p>De 5 a 20 puntos por m²</p>  <p>0.25 – 1 g (Tamaño del punto de aplicación) 0.5 cm de diámetro.</p>	<p>Almacenes, cocinas industriales, granjas, industria en general, industria alimentaria, tiendas departamentales, hogares, oficinas, hospitales, hoteles, aviones y cualquier lugar donde se encuentren las cucarachas.</p>